Aktuális növényvédelmi teendők és a nyugati dióburok-fúrólégy elleni védekezés lehetőségei

Zsigó György

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

KKOSZ, Budapest, 2021. október 04.

Aktuális növényvédelmi teendők

Aktuális növényvédelmi teendők, 19. felhívás

„Amennyiben a gomba terjedésének kedvező napok jönnének, pl. a Chorus 75 WG (14 nap), *Botrefin (21 és 35)*, Quadris (7 nap), Switch 62,5 WG (bor:21, csemege:35 nap), Teldor 500 SC (csemege:7 illetve bor:14 nap), Cantus (é.vi. 28 nap), Prolectus (bor 21, csemege 14 nap), Qualy (21 nap), Cabrio Top (35) az engedélyezett III. kategóriás gombaölők. „Bioszerek” a Botector és a *Polyversum*, melyeknek várakozási ideje a „nincs korlátozás”…

KÖZVETLENÜL SZÜRET UTÁN, LOMBLEMOSÁS:

kén + olaj + (réz)

A sőlőlisztharmat áttelelése

A fertőzés indulása, tavasszal

Aktuális növényvédelmi teendők, 20. felhívás

Egyre nagyobb gondot okoznak a **tárolási betegségek**. A gyümölcsök felületén vihetjük be azokat a gombákat, melyek rothadási folyamatokat indíthatnak be a tárolóhelyiségekben. Több permetszer is kapható melyekkel a szüret előtt „letisztíthatjuk” a gyümölcsök felületét. Ilyen pl. a Bellis (7 nap é.v.i.) és a Switch 62,5 WG (3 nap é.v.i.) Ez utóbbit a monília elleni szerek között is felsoroltam. A kórokozó gombákat kiszorító, ún. antagonista gombát tartalmaz a Blossom Protect „bioszer” (jelölése: nk, azaz nincs korlátozás az é.v.i-ben).

Aktuális növényvédelmi teendők

20. felhívás

dióhéjlégy avagy **dióburoklégy avagy dióburok-fúrólégy avagy nyugati dióburok-fúrólégy** /*Rhagoletis completa* **/**

dióhéjlégy avagy **dióburoklégy avagy dióburok-fúrólégy avagy nyugati dióburok-fúrólégy** /*Rhagoletis completa* **/**

dióhéjlégy avagy **dióburoklégy avagy dióburok-fúrólégy avagy nyugati dióburok-fúrólégy** /*Rhagoletis completa* **/**



dióhéjlégy avagy **dióburoklégy avagy dióburok-fúrólégy avagy nyugati dióburok-fúrólégy** /*Rhagoletis completa* /

Jogszabályi státusz: 7/2001 1A/I a) 29q

Elterjedése:

É-Amerika
-Kanada
-USA

Európa:

-Svájc	1983
-É-Olaszország	1998
-Németország	1993
-Szlovénia	2005
-Franciaország, Ausztria	2008

Tápnövény: *Juglans* spp.

75-90%-os kártételt okozhat a dióültetvényekben!



Életmód

egy nemzedékes

- imágó (július elejétől augusztus közepéig) hosszan
- tojásrakás (július végétől szeptember közepéig)
- L1 (augusztus eleje) felszívódó?
- bábozódás a talajban

Kártétel

A fertőzött termés általában érés előtt lehullik a fáról, valamint a terméshéj gyakran elszíneződik, megpenészedik, piaci értéke csökken. A tünetek könnyen összetéveszthetőek a dió baktériumos betegségével.+aszály

Szőnyegi Sándor előadásából

2021. Óbudai Megfigyelőkert

Talán van remény…

Talán van remény… ez is egy légy! Injektálás ? Egyelőre tilos!

A nyugati dióburok-fúrólégy elleni védelem törzsinjektálással (második éves eredmények)

előadó: K**iss Máté,** doktorandusz

MATE Növényvédelmi Intézet Budai Campus Rovartani tanszék

Az ülést **<u>2021. október 4-én 15.00 órakor</u>**
a Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
(1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
előadótermében tartjuk.

Talán van remény… ez is egy légy!

Jó hírek, új engedélyek 2021-ből:

- Talán kisebb a kártétel. Tisztítással több megmenthető.
- (A Cera-trap már engedélyezve volt csapdázáshoz)
- A Combi-protec megkapta az idén (???)
- A Coragen 20 SC is megkapta az idén

Talán van remény… ez is egy légy!

Jó hírek, új engedélyek 2021-ből:

20. felhívás, 2021. szeptember 1.

- „ Jelenleg a zöld héjon látható 2-3 mm-es, fekete foltok árulkodnak a légy jelenlétéről. Még érdemes permetezni! A Mospilan 20 SG (30 nap é.v.i.) + a Karate Zeon (14 nap é.v.i.) illetve az idei újdonságok, a Combi-protec + csökkentett dózisú Mospilan 20 SG és a Coragen 20 SC (21 nap é.v.i.) is használható.”

Köszönöm figyelmüket!

www.zsigogyorgy.hu (felhívások- ki kéri?, rajzási táblázatok)
és
www.gazdabolt.hu (kisfilmek és a YouTube csatornájukon egyperces videók)
és
www.biokutatas.hu (2021-től „biofelhívások és biofilmek” a csatornájukon)

MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI · KAMARA ·