



Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara



Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken

2025. évi 7. levél

Nem örülhettünk sokáig a lehülésnek és az esőknek. A héten újra a száraz forrósággal, a magas UV sugárzással küzdöttünk. A met.hu nem ígér változást. A melegkedvelő atkákkal és tripszekkel újra számolnunk kell!

► Jelenleg nem alakult ki járványhelyzet egyetlen kórokozótól (gombák, baktériumok) sem. A kártevők (pl. rovarok, atkák) közül viszont néhány faj kimondottan kedvelte a júniusi kánikulát. A júniusban megsokasodott **takácsatkák** a hűvösebb, csapadékosabb júliusi hetekben fáztak, nem terjedtek. A múlt héten újra támadásba lendültek, a fiatal leveleken is megjelentek pl. rózsán, hárson találkoztam a fertőzésükkel (6. levél). Az atkákhöz hasonló időjárást kedvelnek a **tripszek**. Közterületen leggyakrabban a fagyal vagy másnéven az orgonatripszel találkozhatunk. A júniusi felszaporodásuk után, a július 14-én fotózott sövény napsütötte, szárazabb felén már lehullottak a levelek. Kezdetben az atkakártétellel is összetéveszthető a károsításuk, a szivogatásuk, de a pattanva repedő levelek egyértelműen a tripszekre utalnak (lásd a középső fotót). Rejtett életmódú fejlődési alakjaik is vannak, melyeket nem tudunk elérni permetezéssel, ezért a kezeléseket általában ismételni kell. A rovarölő szerek kiválasztását bízzák a növényorvosukra. Más tripszfajok az egynyáriaknál is nagy gondot okozhatnak.

► Az ültetvényekben már bevett gyakorlat a napperzselést kivédő, a káros hatásukat csökkentő növényi „napolajak” használata. A házikertekben is terjed a használatuk, de ott még az árnyékolással védekezhetnek pl. a jól ismert raschel hálóval. Ez a módszer a közterületeken nem használható, mert éppen a lényegét, a növények díszítő értékét csökkentené a letakarásuk. Elképzelhető, hogy a jövő árajánlatkéréseiben önálló tételként is szerepel majd a napégés elleni permetezés tétele? Az alábbiakban a közterületi, dísnövényes gyakorlatra alakítom át a kollégáktól a [18. házikerti felhívásban](#) összegyűjtött javaslatokat.

Meg lehet előzni vagy legalább csökkenteni lehet a Nap káros hatását, a napégés kialakulását.

- A nagy gyökérzettel és nagyobb lombfelülettel rendelkező fajták több vizet tudnak felvenni és többet tudnak párologtatni, hűteni. Ehhez persze öntözni kell, hogy elegendő nedvesség legyen a talajban.

- Az ellenálló növényi bőrszövet kialakításával is sokat tehetünk a növényeinkért (kerüljük a túlzásba vitt nitrogéntrágyázást).

- A legtöbb parkban nem tudunk ágyást váltani az árnyékosabb parkrészbe, ott megelőzőképpen „napolajokat” is használhatunk. Ilyen pl. a szilícium tartalmú Prosilicon lombtrágya. A Biosol-kálicsappanról vagy az olajtartamúakról (pl. a Vektafid A, a Vegarep EC vagy a Melius) is jókat hallottam. Ezek rugalmasabbá teszik a bőrszövetet és tapadószerként is beváltak.

- A szilícium, a kalcium és a kálium is erősíti a növényi bőrszövetet, ezek több lombtrágyában is megtalálhatóak.

- Sok biostimuláló készítmény algát, illóolajat, humuszt, aminosavat tartalmaz, kifejezetten a hőstressz kivédésére reklámozzák ezeket. Nem növényvédő szerek, tehát közterületen bármikor használhatóak.

- Párás, borult napok után érzékenyebbek a növények, érdemes ekkorra időzíteni a védekezést.

- A sövények visszametszése után elérhetik a napsugarak az addig rejtetetten, árnyékban lévő, gyakran etiolált hajtásokat. Ekkor találkozhatunk azzal a tünettel, hogy a sövény sor belsejében jelentkeznek a napégés tünetei.

- A tarkalevelű növények különösen érzékenyek, először a világos bőrrészekben jelentkeznek a perzseléses tünetek, lásd a fényképet.

► Az idén is megrendezik a **HUNGAROGREEN konferencia 2025**-öt. A program nemsokára felkerül [ide](#).



Budapest, 2025. augusztus 10. Jó egészséget kívánok Önöknek és a növényeiknek is: Zsigó György, NMNK