



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátok!

2009. évi 15. felhívás

Az elmúlt héten nagyot fordult az időjárás. **Viharos szelek és záporok** segítették a nedvességet kedvelő gombákat és a seben keresztül, immár a gyümölcsöket fertőző monília fajokat.

► Elsőként a **csonthéjasok sztigminás levéllukacsosodásra** hívom fel a figyelmüket. (Mi még klaszterospóriumos levéllukacsosodásnak tanultuk.) Sajnos sok kertben már a fák alatt van a levelek nagy része. Azonnali permetezéssel talán még megmenthető a lombzat maradéka. Mindenképpen szedjék össze, ássák be a lehullott foltos, lyukacsos leveleket, mert ezekről folytatódhat a fertőzés. Szerencsésebb helyzetben van az aki már kezelte a fáit. A 11. és a 13. felhívásban megkongattam a vészharangot, az ott közölt szerekkel most ismételni kell. A letermett meggyenél és cseresznyénél pedig már nem kell számolnunk az élelmezés-egészségügyi várakozási idővel. Feltétlenül védjük leszüretelt fáinkat is. Az idén megbetegedett vesszők 2010-ben nagy járványt indíthatnak. A jövő évi termőrétegek kialakulásához is egészséges lombzat kell egészen a nyár végéig. A súlyos helyzet miatt javaslom, hogy felszívódó (pl. **Topsin-M 70 WP, Topas 100 EC**) és kontakt gombaölőkkel egyszerre permetezzünk. Ez utóbbiakhoz sorolhatjuk a mankoceb hatóanyagúakat: **Dithane DG Neo-tec és M 45, Manzate 75 DF, Manco 80 WP, Penncozeb DG és Plus, Vondozeb DG és Plus, stb.** valamint a réztartalmúakat, melyeket az 1. levélben csoportosítottam. Most jól használható a fenti hatóanyagokból gyárilag kombinált **Cuprofix 30 DG, Cupertine M, stb.** is. Nyár közepén járunk, a kajszli, a szilva, a mandula és az őszibarack termése már jobban bírja a rezet.

► A széltől összeverődött, jégtől sérült gyümölcsöket azonnal megtámadják a különböző **monília fajok**. Most az almásokon és a csonthéjasokon egyaránt megtaláljuk tüneteiket. A hirtelen jött esőtől kirepedő, vékony héjú fajtákon különösen nagy pusztítást csinálnak. Rothadó, barnuló foltok, később penészgyep kiverődése jelzi a gomba útját. A fent felsorolt gombaölők közül sok a monília ellen is bevethető, a többi készítményt megtalálják a 2. és a 11. felhívásban.

► Alma és körtelevélen már 2-3 hete megjelentek a **varasodás** barna bársonyos foltjai. Sajnos több kertben már nagyon erős gyümölcsfertőzést is láttam körtefákon. Nem csodálkoztam, az időjárás kedvez a varasodásnak. A 3. 4. és a 7. felhívásban írtam a technológiáról. Aki eső után gyorsan ismételni tudja a permetezést az már áttérhet a kontakt szerekre. A „hétvégi” kertészek kénytelenek a drágább felszívódókat is bekeverni a kontakt fungicidok mellé.

► A lisztharmat mellett feléledt a **szőlő** második legveszélyesebb gombabetegsége, a **peronoszpóra** is. Még idáig nem találok súlyos lomb illetve fürttünetekkel. A nedves, hűvösebb idő miatt megelőzőképpen védekezni kell. Változékony az időjárás tehát permetezzünk lisztharmat ellen is, nem csökkent a fertőzés veszélye. Az előzőekben többször is szoltam a készítményekről. A „hétvégi” kertbarátok itt is nehezebb helyzetben vannak: csak rézzel és kénnel nem boldogulnak.

► A meleg, száraz hetek alatt felszaporodtak az **atkák**. Szívogatásuk nyomán már fakulnak a levelek, később a gyümölcsök következnek. Az idén feltűnően sok tojást raktak. A 4. felhívás szereit közül kiemelkedően jó tojásölő hatású az **Omite 57 E** és a **Nissorun 10 WP**. Néhány atkaölő évente csak egy alkalommal mehet!

► A szárazság miatt már most rágnak a szomjazó **darazsak**. Permetezéssel nehéz elcsípni őket. Szűk szájú palackokból készítsünk cefreccsapdát (borral, szörppel, mézzel, cukorral, stb.) és akasszuk ki a védendő területre. Többet helyezünk ki egy kertbe és ecetet is tegyünk a csalogató folyadékba, így elkerüljük a hasznos méheket.

► Most érdemes alaposan tanulmányozni a **táblázatot**. Nagy eltérés mutatkozik a kerületek között. A tarka-szőlőmoly kivételével továbbra sincsenek egyértelmű rajzáscsúcsok és sok a kérdés.

Vajon miért esett le nullára a XI. kerületben az almamolyok száma? A körzeti időjárás hatása? Gyakorlatilag szünet nélkül védekezni kell a molyok ellen. Ismételjünk 10-14 naponta kitinszintézis gátlók és a lárva elleni készítmények kombinációjával. A 3. és a 7. felhívásban a fentiek szerint csoportosítottam a rovarölőket.

► A feromoncsapdák még nem, de a fénycsapda már fogott **gyapottok-bagolylepkét**, sőt rágott bimbójú muskátliról is hírt kaptam. Kelnek a hernyói, melyek a paprika, paradicsom, bab, borsó, káposzta, napraforgó és még számos haszonnövény mellett berágnak a muskátliba, petúniába és a rózsába is. Sok bejelentést kaptunk a lakótelepekről, az erkélyek virágaiban is szép pusztítást végeznek. Főleg a bimbókat kedvelik. Rövid ideig tartózkodnak a növény felületén, ekkor kell elcsípni őket. **Aeroszolokkal (Fito-Insect, VAPE-GARDEN-FITO levéltetű elleni aeroszol, Bio-Sect spray, stb.)** vagy pl. a felszívódó **Actara 25 WG-vel** védekezhetünk. A 8. felhívásban az Actarás beöntözést ismertettem, leanderen levéltetű és pajzstetű ellen bevált.

Budapest, 2009. július 02-án.

Üdvözlettel:

Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!