



Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara



Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken

2016. évi 5. levél

► A **platánoknak** jót tett az esős tavasz. Szépen fakadtak, gyorsan fejlődtek. Sajnos a kórokozónak is kedvezett a csapadékos, párás időjárás. Megjelentek az **apignomóniás betegségének** a tünetei, a hajtáscsúcsok elszáradása és a levelek főerei menti elhalások. Később a nagyobb ágak és a törzs hosszú, rákos sebeiért is felelőssé tehető. Jó néhány fán a levelek 40-50%-a is barnán lóg. Szerencsére a Topas 100 EC közterületi gombaölő erre a betegségre is engedélyezve van. (Az őszi és tavaszi lemosáskor pedig a réz lesz a főszerep.) Ugyanilyen erővel támadott a **platán lisztharmata** is. A mai fotón, baloldalon lent, már a fiatal levelek és a hajtáscsúcsok súlyos torzulását láthatják. Korai lombhullással járhat és az ismételten kihajtó levélkéék újból fertőződhetnek. A Topas 100 EC és a Tazer 250 SC is engedélyezett lisztharmatra, mindkettő felszívódó készítmény. Feltétlenül adagoljanak a permetlébe kontakt kéntartalmú gombaölőt is (Thiovit Jet).



► Megérkeztek a platánokra a rovarok is. Az előző levelemben az egészségesen áttelelt **platán-csipkésposzka imágókról** írtam, ma már a fonákon szétrajzó lárváit és a levél színén megjelenő szívásnyomaikat fényképeztem. Nyár közepére az egész lombzat kisárgulhat. A klorofill nélküli levelek nem biztosítják a fák tápanyagellátását. Ezzel a csökken a platánok stressztűrőképessége, amire a városi környezetben, a nyári szárazságban vagy éppen a téli fagyokban nagy szüksége lenne a fákknak. Évekkel csökkenhet az élettartamuk! Májusban az idén is kikeltek az **amerikai lepkekabóca** lárvái. A fehér viaszszálak bizonyítják a jelenlétüket, mert ez a testfelületükről kerül a levelekre. De a frissen kikelt lárvát is megtaláltam, bekarikáztam a fényképen.

Amennyiben két permetezést is megenged a költségvetés, akkor most a gombák ellen gyorsan kezdeni kellene. Természetesen ebben az esetben is érdemes rovarölővel kiegészíteni a permetlevet, hiszen a kártevők lárvái már jelen vannak. A felszívódó Mospilan 20 SG mellé adagoljanak a kontakt Decis Megából is.

Amennyiben csak egy kezelésre futja, akkor Önöknek kell döntenie. A gombafertőzésre vagy a később kicsúcsosodó rovarjárást helyezni a hangsúlyt. Ez utóbbi esetben még - időjárástól függően - néhány hét múlva is ráérnek a védekezésre. A viaszos levelek miatt, feltétlenül használjanak tapadásfokozó szert is.



Budapest, 2016. június 6.

Üdvözlettel:

Zsigó György, NMNK