


Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara



Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken


2017. évi 8. levél

► **Megjelentek a kötelezően irtandó gyomok is.** A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a növényvédelmi tevékenységről) 2. § -a szerint „a földhasználó és a termelő köteles védekezni, **különösen**” pl. a parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*) vagy pl. az **aranka fajok** (*Cuscuta* spp.) ellen. Az aranka fajok elleni további kötelezettségekről, a 3. § még részletesebben fogalmaz. A hatóság szankcionálási eljárása hasonlít a parlagfű esetében alkalmazottal.

Terjesztésében a járművek és az állatok játsszák a főszerepet, a közterületeken. Az első fotón egy nyári virággyásban láthatják az indáit, a palántákkal, a szennyezett palántafölddel hozták be a karantén gyomot. A folyamatosan virágzó és magot érlelő és azt elhullajtó arankát csak folyamatos ellenőrzéssel és a fertőzés esetén elvégzett azonnali gyomirtással lehet eredményesen gyéríteni (glifozát hatóanyagú gyomirtók).

A 2008. évi XLVI. törvényben szereplő június 30. határidő után már bimbós **parlagfű** esetén is bírsághozhat a hatóság. Beindultak a felderítések, közterületeken is. De ha az allergiásokra gondolunk, akkor a lelkiismeretünk is azt diktálja, hogy irtsuk a parlagfűvet. A gyomlálás, a kihúzás a legeredményesebb de lassú, munkaigényes módszer. Természetesen a kapálás, rotálás, kaszálás és a gyomirtó szerek is szóba jöhetnek. Ez utóbbi esetben a glifozát hatóanyagúak közül engedélyezett néhány készítmény közterületen.

A NÉBIH ingyenesen hívható zöld száma, ahol a lakosok a bejelentéseket megtehetik: +36 80/263244. Egyéb bejelentési lehetőségeket a mellékletben találják. Csatoltam a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara júliusi helyzetjelentését is.



► A fák alatti járdán, a nagy mézharmatcseppek az **amerikai lepkekabócára** utalnak. Valóban, a lehullott platánlevél fonákján láthatják is a lárvatelepeket. Pontosabban már inkább csak a maradványait, a fehér viszszálakat. Még feltűnik néhány idős, nagy testű lárva, de többségében a szárnyas szürke „lepkéket” az imágókat riasztjuk fel. Ezek most párzanak, tojást raknak és jövő tavasszal találkozunk majd újra, a lárvákkal. Ahol még a permetezés mellett döntenek, ott az előző felhívásban megadott rovarölökkel védekezhetnek.

► Az elhagyott lepkekabóca lárvatelepe árnyékában a **platán csipkésposzka** imágóját és a tojásaiból kikelt lárváit, ürülékcsomóit láthatják. Eljött a permetezés ideje, ez ellen, a szívogatásával ténylegesen súlyos növényi kártételt okozó rovar ellen. „Kötelező” a permetezés, különben száraz, kifakult levelekkel érik meg a platánok a nyár végét. A klorofillal rendelkező, egészséges leveleknek őszig még sok feladatuk van! A vesszőkbe, rügyekbe juttatott tápanyagok biztosítják pl. a fák szárazság és fagyűrőképtességét. A felszívódó Mospilan 20 SG (és névváltozatai: Gazelle 20 SG ill. SP, Spilan 20 SG, Rafting, Attack és Attack SG) mellé javasolom, hogy adagoljanak Decis Megát és valamelyik tapadásfokozót is. Mivel egyre erősebb a platánlisztharmat fertőzése is, ezért kontakt kéntartalmú gombaölővel is kombinálják a permetlevelet (Thovit Jet, Microthiol Special).

További fotóért, a házikerteseknek szóló felhívásokért és a rajzosi táblázatok megtekintéséért látogassa meg az Agroinform.hu mezőgazdasági portált.

Budapest, 2017. augusztus 2.

Üdvözlettel:

Zsigó György, NMNK

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.

e-mail: novkamara@t-online.hu

telefon: (1) 246-2946