

A tejsavó felhasználási feltételei

A készítmény: tejipari melléktermékként nyert tejsavó (60-80 g/l koncentrációjú)

Rendeltetés: gombaölő hatású szer

Felhasználási technológia:

A tejsavó vizes oldata felhasználható **kabakosokban** (uborka, cukkini és tökfélék) lisztharmatok ellen hajtatott körülmények között.

A készítmény 0,6-3%-os vizes oldata (0,6-3 l tejsavó / 100 l víz) permetezéssel juttatható ki. Az oldatból hektáronként 1000-1500 l használható fel. Száz m²-re számítva, a tejsavóból 0,06-0,3 l-t 10-15 l vízben feloldva javasolt kijuttatni. A készítmény hektáronkénti mennyisége nem haladhatja meg a 30 litert. A permetezéseket 3-5 alkalommal, legalább 7 napos permetezési időköz betartása mellett célszerű elvégezni a növények vetését követő harmadik héttől (9. kiterült levél BBCH 19) kezdődően az intenzív inda/hajtásnövekedés végéig (BBCH 49). A kezelések a virágkezdemények megjelenését követően már nem folytathatóak. A permetezéseket nappal, lehetőleg a reggeli órákban kell végrehajtani.

Az elkészített permetlevet mielőbb fel kell használni, nem szabad fémtartályban tárolni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő tartása nem szükséges.

Az Európai Bizottság felülvizsgálati jelentése a tejsavóról [innen](#) letölthető.