



Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2017. évi 7. felhívás

► Ma reggelre befagyott a madáritató. Hogy vészelték át a még virágzásban avagy szíromhullás utáni állapotban lévő gyümölcsfák, a kiültetett palánták a néhol – 5 °C fokos hideget? Az esetek nagy részében ez majd később derül ki. **Most segíthetik a növények regenerálódását, komplex lombtrágyák kijuttatásával.** Az algtörzseket, aminosavakat, humuszzármazékokat, gyógynövények kivonatát, stb. tartalmazó készítményeknél is stressztűrő képesség növelését emelik ki az engedélyokirataik. Ezekkel is próbálkozhatnak, reméljük mihamarabb megjelennek a kiskiszerezésű változataik is.

► **Egyre nagyobb gondot okoznak az atkák.** A lisztharmatokhoz hasonlóan a meleg, szárazabb körülmények között is jól érzik magukat, szaporodnak. Az elmúlt évekre jellemző nyarak kánikulai hetei sem törik meg a fejlődésüket. **A leglátványosabb tüneteket a gubacsatkák okozzák.** A házikertekben szerencsére nem súlyos a kártételük, inkább ijesztő a fehér nemezzréteggel bevont szőlő és diólevelek látványa illetve a bibireses kinövések miatt is kapok aggódó hívásokat. Már megjelentek a telepeik, a fotók a múlt héten készültek (dió nemezes gubacsatkájának és a szőlő gubacsatkájának a kártételét láthatják).

Most még lehet védekezni. **Szőlőben** számos atkaölő engedélyezett, pl. Envidor 240 SC, Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP, Flumite 200. A két utóbbi készítmény képes áthatolni a levéllemezen, állítólag még a gubacsokba is bejutnak. A Flumite 200 **dióban** is engedélyezett, július 31-ig lehet felhasználni.

**Szőlőben sokkal nagyobb kárt okozhatnak a szabad szemmel nem látható levélatkák.** Van olyan ültetvény ahol már kétszer is permeteztek ellenük, az idén. A megtámadott tőkék későn fakadnak, a gyenge hajtásokon kicsi, csökött, gyűrött levelek fejlődnek. A virágzat is elszáradhat. Aki rügyattanáskor kénes lemosását csinált, az lépéselőnyben van. Most a fenti készítmények közül válasszanak, apró cseppekkel és bőséges lémenyiséggel permetezzenek. A károsítása összetéveszthető pl. egyes vírusok vagy táphiányok tüneteivel is, a harmadik, júniusi fényképen valószínűleg a levélatka kárképét láthatják. (Mikroszkóppal lehet beazonosítani a kártevőt.)



► A jövő hétre már melegebb napokat mondanak. A mostani csapadék kipárolgása elegendő lesz a gombás betegségek beindulásához. Az **almatermésűek és a szőlő is a permetezendő növények sorába léphetnek.**

► Lassan az összes alma és körtefajta elvirágzik. A szíromhullás utáni stádiumban, az intenzív hajtásnövekedés alatt az érzékeny fajtáknál a **lisztharmat** okozhatja a legnagyobb bajt. Ne engedjék be a lombfelületre a kórokozókat, mert innen terjednek át a gyümölcsökre. A csökött termés lehullik, de a leszüretelt, parás felületű almák tárolhatósága is rosszabb lesz. **A lisztharmat elleni alapvető hatóanyaggal, a kénnel, a kis gyümölcsök kb. zölddió nagyságáig, a viaszosodásig csak óvatosan bánjanak! Perzselhetik a növényeket.** Ne lépjék túl az ajánlott dózisokat és inkább délután permetezzenek. A gyakori esők is sérthetik a viaszos felületet de a kontakt gombaölők különben is lemosódnak. **Most eljött a felszívódó (szisztémikus) szerek ideje.** Ezeket a beszáradásuk után már nem mossa le az eső, viszont felhíghulhatnak a gyorsan növekvő növény testében. Ezért ismételní kell a permetezést, 2-4 alkalommal, 8-10 napos fordulóval, az előírások szerint. Ezt nevezik szisztémikus blokknak. Ilyen a Score 250 EC, a Cyflamid, Difcor 250 EC, Difo 25 EC, Systhane Duplo ( még felhasználható ), a Topas 100 EC (és a változatai a Penco 100 EC és az Agria Penconazol) és a Nimród 25 EC is.

Budapest, 2017. április 21.

Jó kertészkedést kívánok:

Zsigó György, NMNK

A Hermes ÁFÉSZ üzleteiben a megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak!