




Dísznövények védelme

80 órás tanfolyam anyaga

- 
- Kertkultúra fejlődésével ma már egyre nagyobb igény van a pihenő, és díszkertekre.
 - Nézzük meg a környezeti feltételeket, adottságokat megfelelnek-e a választott növényeinknek:
 - Talaj pH, kötöttség, mésztartalom, vízgazdálkodás

- 
- Vízellátási lehetőségek,
 - Faj, fajta igénye, ellenállósága
 - Környezeti kitettségek (árnyékoltság, fagyveszély, fényviszonyok, viharveszély)

- 
- A fentiek figyelembe vételével a legalkalmasabb, honos növényekkel díszítsünk
 - Igen sok dísznövény van, csak néhány fontosabb fajról beszélünk: rózsza, muskátli, örökzöldek (fenyőfélék)

- **Rózsa:** Több változatát termesztik: törpe- minibokor (hajtatásban is), futó rózsák.
- **Károsító** érzékenységük is ehhez igazodik.
- **Betegségek:** rózsa lisztharmat. Leveleken, hajtásokon, bimbón is megjelennek. Növényt gyengítik.

- Védekezés: metszés, tápanyag, kénnel ne, mert perzselheti a virágokat.
- Rózsa rozstda, levélfoltosságok: barnuló vörösödő foltok a leveleken , korai lombhullás. Kontakt szerek is jók, erős fertőzésnél a strobil-származékok kombinációban.

- Rovarok: levéltetvek szívogatnak, hajtások torzulnak, virág bimbóban marad, feketedik. Megjelenéskor levéltetű elleni szer.
- Levélsodró rózsadarázs: Meleget kedvelő, ilyen termőhelyen erősebb, gyakori fertőzés. A tojásokat a levél szélére rakja. Ezek leszedése, fertőzött részek eltávolítása, elégetése, vagy vegyi védelem.


- **Muskátli** . Több változatát termesztik. A rozsdá, lisztharmat a leggyakoribb betegség.
- Kártevői jelentősebbek: tripsz. Főleg a futó fajták a legfertőzöttebbek. Levelek fonáka erősen szőrözött, megvastagodott. Már kiültetéskor védekezni kell, majd egy két alkalommal megismételni, levelek hátoldalát, fonáki részt kell kezelni.

- Gyapottok bagolylepke is szereti. Mindegyik változatra veszélyes, de a bagolylepke lárvák is károsítják.
Védekezés : megjelenéskor. Éjszakai kártevők, nappal nem láthatóak a lárvák a takarásban kell keresni őket.
- Vízigényesek, napfényt is szeretik, legfeljebb félárnyékban. Káli túlsúlyos lombtrágya kell hetenként az öntöző vízhez.

• Örökzöldek

- Igen sok változatukat ültetjük: fenyő, tuja, ciprus, stb. Ma már sok károsítójuk van, amelyek vagy rendszeresen, vagy egyes évjáratokban jelentkeznek: levéltetvek, pajzstetvek, tűrontó gombák.
- Levéltetvek főleg fenyőkön, luc és ezüstön.

- Lucfenyő gubacstetű, vesszőkön megvastagodás, gubacs képződik. Erősen visszaveti a növekedésben a fát.
- Tujákon a tujafűró aranymoly a leggyakoribb. Tuja hajtás ágpusztulást okozó gombánál a képlet is látható.
- Vörösfenyő aknázómoly is gyakori.
- Borókán a borókaszú, pajzstetű.

- 
- Védekezések összetettek: jó termőhely, vízellátás, párasítás, itt is kell tápanyag utánpótlás.
 - Hajtásmegindulás kezdetén kell védekezni gomba, rovar ellen és nyár végén.