

► Az előző felhívásban a **gamma bagolylepke inváziójáról** írtam és bemásoltam dr. Hertelendy Péter növényorvos kollégám cikkét. Havasréti Béla levélben válaszolt a felhívásra és megengedte, hogy elküldjem Önöknek is a lepkével kapcsolatos gondolatait. Mellékelem. Mindketten kiváló szakemberek, már többször fordultam hozzájuk a kérdéseimmel. Vándorlepke, de itt is áttekel, részben ezért sem látjuk tisztán a nemzedékeit, a biológiáját, a fejlődését és épp ezért a várható kártételét illetően is megoszlanak a vélemények. Béla felmérései alapján 2-3 nemzedéke is lehet egy évben, így egész nyáron találkozhatunk vele. Ha Péter gondolatai igazolódnak, akkor semmilyen gondot sem okoz. Kb. most kelhetnek ki a hernyók a kertekben. Mindenképpen érdemes fokozottan figyelni az [araszólva mozgó hernyóira](#) (6 másodperces videó). Az adott növényre engedélyezett rovarölő szerek közül választhatnak lásd pl. a 11. felhívást. Az érésben lévő zöldségféléknél már az élelmezés-egészségügyi várakozási időkre (é.v.i.) is figyelni kell.

► A **gyapottok bagolylepkére** bezzeg biztosan „számíthatunk” (15. felhívás). A kertjeinknek, de pl. a kukoricának is a legárázabb kártevője lett. Jó kis [összehasonlító táblázatot](#) találtam a két bagolylepkéről.

► **Poloskák** a zöldségféléken, a málnán, a ribizskén és pl. az eperfán is. Az imágók párzanak és a lárvákkal együtt károsítanak. Talán nem túlzás, hogy a zöldségágyások legjelentősebb kártevői lettek. A kémiai alapú rovarölő szerek közül a NÉBIH keresője néhány növény esetében a lambda cihalotrin (pl. Karate Zeon, Kaiso Garden), az acetamiprid (pl. Mospilan 20 SG) hatóanyagúakat kínál fel bizonyos növényekre. Az egyszerű anyagok között nem találtam ajánlást. Raszik Viktória könyvében a varádíccsal való permetezést javasolja illatfedés céljából a bogymászó poloska ellen.

Érdemes megnézni a [Combi-protect engedélyokiratát](#). Valamilyen okból csak őszibarackban, nektarinban, mogyoróban és almában engedélyezett az ázsiai márványospoloska csalogatására. A technológia hasonlít a diólegynél megismerthez. Gyűjti az ázsiai márványospoloskákat a [HalyCatch](#) Ázsiai márványospoloska csapda. Az elmúlt években jelent meg a Faecet Bio GEKKA L biostimulátor és poloska-riasztó. Felhasználásáról pl. ezt a [leírást](#) találtam és sok videót is készítettek a Faecetről. Örölnék a visszajelzéseiknek mindhárom készítménnyel és a Neemazal-T/S poloskairtó hatásával kapcsolatban is. Se szeri-se száma az otthoni próbálkozásoknak. Ujhelyi Kálmán módszere biztosan működik, megtalálják a [kertbarat_2024_20.pdf](#) felhívásban.

► Úgy látom, hogy az üzletekben már csak fólia alatt termesztett paradicsomot és paprikát vehetünk. A szabadban a károsítókkal, a szélsőséges időjárassal és a napégéssel is küzdenek a kollégák. Egyre inkább a fóliásátor vagy az üvegház lesz a megoldás, lassan a gyümölcsstermesztőknek is!

A cukorfokot növelő **napsugarak perzselhetnek is**. A tünetek felismerése sem egyszerű, mert hasonlítanak a hiánybetegségeknél jelentkező elváltozásokra. Amennyiben a napos oldalon látjuk, a durva körvonalú, a levelek mintázatával nem összefüggő foltokat, akkor biztos, hogy a napperzselésről van szó. Keddi fotó egy napégette mogyorólevélről.



Meg lehet előzni vagy legalább csökkenteni lehet a Nap káros hatását, a napégés kialakulását.

- A nagy gyökérzettel és nagyobb lombfelülettel rendelkező fajták több vizet tudnak felvenni és többet tudnak párologtatni, hűteni. Ehhez persze öntözni kell, hogy elegendő nedvesség legyen a talajban.

- A szőlő zöldmunkáinál vagy a zöldségfélék levelezésénél hagyjunk takaró leveleket a termés felett.

- Az árnyékolással (Raschel háló, festett fólia, fátyolfólia) és az ellenálló növényi bőrszövet kialakításával (kerüljük a túlzásba vitt nitrogéntrágyázást) is sokat tehetünk a növényeinkért.

- Aki nem tud ágyást váltani az árnyékosabb ketrészébe, az a kertbarát megelőzőképpen „napolajokat” is használhat, ilyen pl. a szilícium tartalmú Prosilicon lombtrágya. A Biosol-kálicszappanról vagy az olajtartamúakról (pl. a Vektafid A, a Vegarep EC vagy a Melius) is jókat hallottam. Ezeknek „nincs várakozási idejük” (nk jelűek), rugalmasabbá teszik a bőrszövetet és tapadószerként is beváltak. A többi gyümölcsnél is használhatóak.

- A szilícium, a kalcium és a kálium is erősíti a növényi bőrszövetet, ezeket keressék a lombtrágyák címkéjén.

- Sok biostimuláló készítmény algát, illóolajat, humuszt, aminosavat tartalmaz, kifejezetten a hőstressz kivédésére reklámozzák ezeket. Nem növényvédő szerek.

- Párás, borult napok után, vagy a sövények visszametszését, a fűtők kibontását követően érzékenyebbek a növények. Erről is dr. Terbe István professzor úr, a még mindig [időszerű cikkében](#).

Budapest, 2025. július 02.

Jó egészséget Önöknek és a növényeiknek is:

Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a fent megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és szaktanácsot is kaphatnak a növényvédelmi végzettségű eladóktól!