

► Október 15-i hír a NÉBIH-től a **szőlő aranyszínű sárgaságát** okozó fitoplazmával kapcsolatban: az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. Az október 18-i híradás szerint, már a [Pannónhalmi borvidéken](#) is megtalálták a beteg növényeket... Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy a kabóca már az egész országban elterjedt. Már hat évvel ezelőtt is csapdáztuk az előrejelző hálózatunkban, mindenhol fogtunk a sárgalapokon, nem kellett folytatni a felderítését. A lenti fotón egy olyan sárgalap részlete látható, melyen a mikroszkópos meghatározást végző kollégánő bejelölgette a szőlőkabóca imágóit.

► **Milyen lehetőségeink vannak nekünk házikerteseknek most ősz közepén?** Hogyan védekezhünk a saját kertjeinkben? Hogyan akadályozhatjuk meg a kórokozót hordozó kabócák felszaporodását, tovább terjedését a szőlőültetvényekre, a magyar borvidégeinkre?

- Úgy gondolom, hogy a házikertesek többsége nem tudja, nem fogja a speciális NÉBIH laborban bevizsgáltatni a gyanúsnak ítélt növényről vett mintáját. A szabad szemmel látható tünetek alapján kell döntenünk és a terjesztő rovar biológiája alapján kell védekeznünk. A levelek sárgulása jelzi, hogy megtörtént a fertőzés. Csak később jelennek meg a tipikus **levéltünetek**, a besodródó illetve színesedő levelek. A fagyok után fennmaradó sárga levelek is a fertőzésre utalnak. Az **egyenetlenül beérő vesszők**, a **rövid ízközök**, a **zsugorodó bogycók**, **fürtök** látványa is a fertőzés gyanúját erősíti meg. (Az idei nyáron talán csak a csapadékosabb nyugati tájainkon okozhatott hasonló fürttüneteket a peronoszpóra.) Néha még a **levedlett lárvabőröket** is megtalálhatják a levelek fonákján. Jó fotókat találhatnak a felsorolatról a [NÉBIH honlapján](#). (A levéltüneteket bemutató, egymás melletti két kép aláírását véletlenül felcserélték.) **Ezekben az esetekben én a tünetet mutató tőkék kivágása mellett döntenék.** Fontos teendő a kiszedett vesszők, tőkék gyors felaprítása és elégetése, mert az otthagyt fás részeken is át tudnak telelni a kabócák.


-Az áttelelő tojások főleg a két-három éves vesszőkön találhatóak, ezért a metszés után, a nyesedék elégetésével is sokat tehetünk az április környékén felébredő kabócatársaság gyérítésére. A ledarált venyigék 10-20 cm-re való beásása, mélyre forgatása is jó módszer.

-A kivágás után kihajtott alanyokat kimondottan kedveli a kabóca, ezeket folyamatosan távolítsák el. A fotón a kivágott kordon sor után kihajtó „alanybokrot” láthatnak.

-A kabócának még gazdanövénye az éger, az iszalag és a bálványfa. Az iszalag és a bálványfa (sokáig ecetfának hívtuk) mindenhol megtalálható. Lehetőleg ezeket is irtsák ki a kertek közeléből, a sarjhajtásaikkal együtt. Az ajánlások szerint az ültetvények 200 méteres körzetéből is el kellene távolítani ezeket a növényeket. A házikertekben ezt nehéz lenne megvalósítani, nekem is csak a szomszéd kerítéséig kellett elmennem az iszalag fotózásához. Fontos tudni azt, hogy a fertőzött szőlőalanyok és a kabóca gazdanövényei sem mutatják a tüneteket, csak hordozzák és a kabócáknak átadják a fitoplazmát.

-Már nem lehet udvariaskodni az elhanyagolt szőlőjű kertszomszédokkal. Végső esetben a hatósághoz kell fordulni, be kell jelenteni az elhanyagolt kertet.

-A őszi és a téligi olajos lemosó permetezés is gyérítheti, befullaszthatja a kéreg alatt áttelelő tojásokat. A narancsolaj pedig kiszárítja a petéket. Több olajtartalmú rovarölő is bevethető, néhányat a fenti weboldal táblázata is felsorol. A tavaszi metszés után ismételjék meg az olajos lemosást és rézzel, kénnel is kiegészíthetik a permetlét.



► **Csak közös összefogással győzhetjük le a betegséget! Rajtunk, kertbarátokon is múlik az, hogy ne legyen második filoxéra járvány a fitoplazmától!**

Budapest, 2025. október 19.

Jó egészséget Önöknek és a szőlőiknek is:

Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a fent megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és szaktanácsot is kaphatnak a növényvédelmi végzettségű eladóktól!