

Jókor írtam az előző, a peronoszpóráról szóló felhívásom. Az [OMSZ térképén](#) kattintsanak a térkép felett, a dátum melletti ►jelre és június 24-től napi bontásban követhetik a levélnedvességgel, a légköri párával kapcsolatos adatokat. A fogékony almatermésűeknél a varasodás (7. és 9. felhívás), a csonthéjasoknál pedig a levéltbetegségek is megélénkülhettek (4. felhívás). A molyokat nem zavarta a hőség, lásd a 12. felhívást. Sajnos az aszályon, az egész országra jellemző [vízhiányon](#) nem segítettek az elmúlt napok esői.

► A **takácsatkák** kimondottan jól érzik magukat a hőkupola alatt, az aszályal sújtott tájakon is. Az elszaporodásukhoz a száraz, meleg időjárás a kedvező. A szövédékhálójuk védi őket a kiszáradástól, a melegben pedig felgyorsul a fejlődésük, akár 10 nap alatt is kifejlődhet egy nemzedék. Most talán fázhatnak, de a hétvégére jószolt meleg nyári napokkal újra beindulhatnak.

Nehéz ellenfélnek számítanak, több okból is. A pókszabásúakhoz tartoznak, tehát a rovarölő szerek többsége nem irtja őket. A speciális atkaölők nem felszívódóak, nem áramlanak szét a növények belsejében! Tehát apró cseppekkel, bőséges lémenyiséggel kell eltalálni a fonákon tartózkodó kisméretű takácsatka egyedeket, melyeket még a szövédékek is védi, mert felfogja a permetcseppeket. További nehézséget jelent, hogy az atkaölők többsége nem viszi el az összes fejlődési alakjukat, tehát váltott szerekekkel lehet védekezni ellenük.

A III. kategóriások közül kiváló, kontakt, de a levéllemezen is áthatoló (transzlamináris) készítmény a **Nissorun 10 WP**, mely csak tojás és lárvaföld hatású, nem pusztítja el az időseket. Tehát folytatódik a párzás és így újra felszaporodnak. Hasonlóan kontakt és transzlamináris a **Flumite 200** is, mely megújuló ún. szükséghelyzeti engedéllyel kerül időről-időre a boltokba. Elpusztítja a fiatal lárvákat és gátolja az atkatojások kifejlődését valamint a nőtény takácsatkák terméketlen tojásrakását okozza. A kontakt **Ortus 5 SC** viszont épp fordítva, az összes mozgó alakra hat, de a tojásokra nem, így a kikelő lárvák továbbra is fenntartják a fertőzést. Tehát váltani - vagy esetleg kombinálni (?) - kell a tojás és lárvaföld hatásúakat az idősebbekre ható készítményekkel. (A Floramite 240 SC is III. kategóriás, dísznövényekre engedélyezett, de úgy látom, hogy nem forgalmazzák.) Az atkákat is kiszárítják a **narancsolaj tartalmazók** pl. a Prev-Gold Garden, mely méhekre mérsékeltan veszélyes. Bár a Boraqua narancsolaj lombrágyának minősül, de azért a méhekre ennél is gondolni kell. Az **olajtartalmúak** bevonják és megfullasztják a takácsatkákat pl. a Microil, a Vegarep, Vektafid A, stb. Ezek lemosószerek is, de most a nyári hígabb dózissal dolgozzanak. A **kéntartalmú** gombaölők is gyérítik az atkákat.

Főleg a leveleket szívogatják és közben a nyálukkal is mérgezik a növényt. A fogyatkozó klorofill miatt halványul, bronzosodik, majd teljesen elszárad a megtámadott levél. Megfigyelhető, hogy a fonákon, a szövédékhálójukba ragadt lárvabőrök miatt porosnak látjuk a leveleket. Túlszaporodáskor a bimbót vagy a fiatal termést is megtalálják. A 2025. évi 19. felhívásban hársfa levelén mutattam meg a takácsatka fertőzés fokozatait. 2026. július 6-án azon a díszbirske bokron találtam meg az induló fertőzés nyomait, melyen tavaly készült a [hónap fotója](#). Két egészséges zöld levélke mellett fotóztam le a fertőzötteket.



Ne hagyják, hogy idáig fajuljon a fertőzés, ebben a kertben máris védekezni kell! Gyakran a gyomokról pl. az aprószulákról terjed át a haszonnövényekre a több mint 200 tápnövényen leírt kétfoltos takácsatka is.

► **Meg lehet előzni vagy legalább csökkenteni lehet a Nap káros hatását, a napégés kialakulását.**

- A nagy gyökérzettel és nagyobb lombfelülettel rendelkező fajták több vizet tudnak felvenni és többet tudnak párologtatni, hűteni. Ehhez persze öntözni kell, hogy elegendő nedvesség legyen a talajban.
- A szőlő zöldmunkáinál vagy a zöldségfélék levelezésénél hagyjunk takaró leveleket a termés felett.
- Az árnyékolással (Raschel háló, festett fólia, fátyolfólia) és az ellenálló növényi bőrszövetet kialakító trágyázással is sokat tehetünk a növényeinkért. A túl sok nitrogén lazává alakítja a szöveteket.
- Megelőzőképpen a szilíciumvegyületeket is tartalmazó „napolajokat” is használhatjuk. Ilyen pl. a Prosilicon, a DefenSivo, az Ino Si, az Ino Green, az Optysil, a Kwars, a SiCa-Rio, stb. A Biosol-kálicsappanról vagy az olajtartalmúakról is jókat hallottam. Ezek rugalmasabbá teszik a bőrszövetet és tapadószerként is beváltak.
- A szilícium, a kalcium és a kálium is erősíti a növényi bőrszövetet, ezeket keressék a lombrágyák címkéjén.
- Sok biostimuláló készítményt kifejezetten a hőstressz kivédésére ajánlják
- Párás, borult napok után a növények érzékenyebbek az UV-B sugárzásra. Halasszuk el a zöldmunkákat.
- Az UV miatt 10 és 16 óra között mi se dolgozzunk a kertben! A hűvös szobában lapozgassák a felhívásokat :-)

Budapest, 2026. július 08.

Jó egészséget Önöknek és a növényeiknek is:

Zsigó György, [NMNK](#)

A [Hermes ÁFÉSZ üzleteiben](#) az engedélyezett növényvédő szereket, a tápanyagokat, a kerti szerszámokat is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak a képzett eladóktól!