

Az országos előrejelző hálózatunk keddi adatai szerint a nyugati dióburok-fúrólégység (a diólégység) rajzása mindegyik csapdapontunkon beindult. [Lásd az táblázat 2026 2-t.](#) A rovar biológiájában nincs változás és a védekezés technológiájában sem láttam nagy újdonságokat. Nem akartam lemásolni a korábbi felhívásaimat, ezért úgy döntöttem, hogy felkérem a fiatal Helman Bálint okleveles kertészmérnök, növényorvos kollégámat, hogy írja meg ő a felhívást. Úgy látom, hogy kiválóan sikerült a munkája. Bemásoltam.

„A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, műtárgyak mentén, a sikertelenül gyomirtott területeken, kiritkult táblarészekben, parlagon hagyott területeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderaliákon, utak szélén, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben fordul elő...Mostanra sok helyen a gyepek kiszültek, ez a parlagfű csírázásához kedvezőbb feltételeket biztosít a nyílt talajfelszín miatt.”- idéztem a [NÉBIH július 20-i jelentéséből](#). A parlagfűről is írt Helman Bálint.

► „A nyugati dióburok-fúrólégység rajzása hosszú hetekig, akár őszig is eltarthat. Július második felében már mindenképpen legyen kint a sárga ragacs lap a diófán! A legyek először a korona napos, felső részét keresik fel, ezért a csapdát is minél magasabbra, jól megvilágított ágra akasszák. A mellmagasságban elhelyezett lapon később jelenhetnek meg, miközben a fa tetején már megkezdődhetett a peterakás. Hetente legalább egyszer nézzék meg a lapokat. A saját kertjük csapdája pontosabb jelzést ad, mint bármely országos adat.

A légy a zöld dióburokot „köpi be”, a kikelő nyüvek pedig a burokban járatokat ráganak. Először apró, besüppedő foltok jelennek meg, később a burok nagy felületen megfeketedik, elnyálkásodik és rászárad a csonthéjra. Korai fertőzésnél a dióbél is összezsugorodhat, megpenészedhet, a termés idő előtt lehullhat. A már a burokban rágó nyüveket permetezéssel nem tudjuk utolérni, ezért a rajzó legyeket kell elcsípni még a peterakás előtt! A tünetek összetéveszthetők a dió baktériumos és gombás betegségeivel, de a felvágott burokban megtalálható fehéres nyüvek elárulják a kártevőt.

A házikertekben is használható a Mospilan 20 SG és a Combi-protec csalogatóanyag együttes kijuttatása. A fehérjetartalmú csalétek a peterakás előtt táplálkozó legyeket vonzza, ezért nem kell az egész fát finom permetköddel lemosni. A lombkorona felső, külső részére nagy, lassan beszáradó cseppeket juttassanak ki. A gyártói kiskerti technológia szerint 2 liter kézmeleg vízhez 100 ml Combi-protec és 4 g Mospilan 20 SG szükséges. Először a Combi-protec törzsszoldatát készítsék el, majd ehhez adják a rovarölő szert. Más készítményt ne keverjenek hozzá! A kezelést a csapdázásra alapozva, a címke szerint kell ismételni; eső után újabb permetezés válhat szükségessé. A növényvédő szer címkéjét és a hatályos engedélyokiratot minden esetben tartsák be!

Permetezés nélkül is sokat tehetünk, de csak akkor, ha kitarthatunk. A lehullott, fertőzött diót folyamatosan, lehetőleg naponta szedjék össze, és ne tegyék a házi komposztba. A nyüvek a burokból a talajba húzódnak, ott bábóznak, majd a következő évben újra rajzanak. A fa alá terített fólia megakadályozhatja, hogy elérjék a talajt; a lehullott termést erről is rendszeresen el kell távolítani. A talaj sekély, ismételt bolygatásával a lárvák és a frissen kelt legyek egy része elpusztítható. Egyetlen elhanyagolt fa azonban a környék diófáit is újra meg újra fertőzheti, ezért érdemes a szomszédokkal is összefogni.

A védekezést nem lehet egyetlen permetezéssel vagy egy hétvégi diószedéssel letudni. A sárgalapokat a rajzás végéig tartsák a fán, a lehullott szemeket pedig a szüret befejezéséig gyűjtsék. Ha az idén következetesen gyérítik a legyet, akkor nemcsak az idei termést menthetik, hanem a jövő évi rajzást is csökkenthetik. A dióburok-fúrólégység ellen valóban igaz: a szép karácsonyi bejgliért már nyáron meg kell dolgoznunk!

► A parlagfűről se feledkezzenek meg! A földhasználó köteles megakadályozni a virágbimbók kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania. A fiatal növényeket gyökerestől húzzák ki, a nagyobb állományokat még virágzás előtt kaszálják vagy kapálják le. Ahol a mechanikai védekezés nem elegendő, az adott területre engedélyezett glifozáttartalmú, totális gyomirtó szerrel kezelhetik az aktívan növekedő parlagfűvet. A permetlé a kultúrnövények, dísnövények és gyümölcsfák zöld részeire ne kerüljön, mert azokat is károsíthatja! Szélsőséges időben, elsodródásmentesen permetezzenek, és minden esetben tartsák be a kiválasztott készítmény címkéjén és engedélyokiratában foglaltakat. A kezelt területet később is ellenőrizték, mert újabb parlagfűnövénnyel kelhetnek ki”

Zirc, 2026. július 23. Sikerekben gazdag kertészkedést kívánok

Helman Bálint

A [Hermes ÁFÉSZ üzleteiben](#) az engedélyezett növényvédő szereket, a tápanyagokat, a kerti szerszámokat is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak a képzett eladóktól!