

Az aszályos időjárás ellenére továbbra is találkozhatunk egy-egy újabb növényvédelmi aktualitással a kertben.

► Ezúttal egy nagyon érdekes megjelenésű gombás betegsége, a **körterozsdára** szeretném felhívni a figyelmüket. A betegséget okozó gomba fejlődési ciklusában a körte mellett fontos szerepe van a borókának is (ezért nevezik borókarozsdának is). Mindkét növényen okoz elváltozásokat, de általában a körtefa leveleinek színén megjelenő narancssárga foltok, majd később a fonákon megjelenő szarvacskaszerű gombatelepek keltik az első riadalmat.

De **ne ragadjunk egyből permetezőt**, ha megtaláltuk a tüneteket a kertünkben! A betegség általában csak a leveleken okoz elváltozásokat, a termést és a fás részek épségét közvetlenül nem veszélyezteti. A már kialakult foltok a permetezés hatására sem fognak eltűnni, ezért **önmagában a tünetek jelenléte nem indokolja a permetezést**. A védekezésnek elsősorban megelőző jelleggel, tavasszal, a fertőzésveszélyes időszakban van értelme, különösen akkor, ha a betegség korábban rendszeresen és erősen jelentkezett. A kórokozó ráadásul a borókán vészeli át a telet, így a következő évi fertőzést sem tudjuk már ilyenkor végzett permetezéssel megelőzni. A fotót a héten készítettem.

Akik mégis úgy döntenek, hogy szeretnének védekezni a betegség ellen, két készítmény közül választhatnak: a **Score 250 EC**, illetve az **Alfa Solo**. Tíz liter permetlé elkészítéséhez 3-5 ml készítmény szükséges.

► Növényeinket nemcsak a betegségektől és a kártevőktől kell óvnunk, hanem a kedvezőtlen időjárási körülmények átvészelésében is segíthetjük őket. Az [időjárás-előrejelzés](#) ismét tartósan száraz, meleg időt jelez. Amennyiben van rá lehetőségünk, **árnyékoljuk növényeinket**, erre kiváló eszköz a Raschel-háló. Továbbá fontos az öntözés időzítése. Kerüljük a tűző napon történő öntözést, mivel ilyenkor jelentős lehet a párolgási veszteség, illetve egyes kultúrákban perzselést okozhat. (Lásd még a [16. felhívást](#).)

A talaj felszínének mulccsal történő takarásával tovább mérsékelhetjük a párolgást, és hosszabb ideig megőrizhetjük a talaj nedvességét. Inkább ritkábban, de nagyobb vízáddal öntözzünk, hogy a víz ne csak a talaj felszínét nedvesítse át, hanem a gyökérzónába is eljusson.

► Paradicsom- és paprikanövényeinkben további károsodásokat okozhat az előttünk álló kedvezőtlen időszak. A nagy hőség és az erős napsugárzás **napégést** idézhet elő.

A **termések csúcsrothadását** nem fertőzés, hanem a nem megfelelő kalciumfelvétel okozza, amelyet többek között a nagy meleg, az egyenetlen vízellátás, valamint a talaj magas kálium- vagy magnéziumszintje is előidézhethet. Az elnevezés megtévesztő, ugyanis a termésen kezdetben száraz, besüppedő folt alakul ki, az esetleges penészedés pedig már csak ennek felülfertőződése. A megelőzésben a kalciumtartalmú lombrágyák használata is segítséget nyújthat. Ilyen például a **FitoHorm 40 Ca**, amelyből **100–150 ml**, valamint a **Genezis Kalcidol**, amelyből **10–100 ml szükséges** 10 liter permetlé elkészítéséhez. A **készítményeket a lombozatra juttassuk ki**, lehetőleg a kora reggeli vagy a kora esti órákban. Fontos továbbá a termést védő lomb megőrzése. Ne távolítsunk el nagy mennyiségű levelet a növényekről, mert a hirtelen napfénynek kitett termések könnyebben károsodnak. (A paradicsomot és az orgonát Zsigó György fényképezte.)

