

► A napfényes, meleg napok felébresztették a kertészek munkakedvét, jónéhány zöldségfélék már el is vetettek. A **palánták** is szépen növekednek a konyhaablakokban. Nem minden lakásban megfelelőek a fény, a hőmérséklet és a páráviszonyok az egészséges palánták előállítására. A gyengén fejlődő növényt gyorsabban megtalálják a **talajlakó káros gombák**. A talajfelszínnél jelentkeznek a tünetek. A palánta szára barnul, elvékonyodik és annyira elgyengül, hogy megadja magát, kidőlnek a növénykék. Ezeket a palántákat már nem lehet meggyógyítani. [Lásd a hónap fotóját.](#)

A Trichoderma gombafajokból készült mikrobiológiai készítményekkel segíthetjük, erősíthetjük a lakásban csírázó, majd később az ágyásban fejlődő növénykét is. Ilyen III. kategóriás pl. a [Trifender WP](#), a Trianum G, a Tyra és a nagyobb kiszerelésű Tigra és a Trianum P. Már a palántázó földbe érdemes bekeverni ezeket illetve később öntözhetnek is az oldatukkal. Egy másik gombafaj spóráit tartalmazza a Polyversum, 50 grammokban is kapható.

A kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények közül palántadőlés ellen a Proplant és a Magnicur Energy gombaölők mellett a Signum WG-t is ajánlja Andrej András a házikerteseinknek szülő és kiváló [Kerti Kalendárium](#) márciusi számában. Ezeket ne keverjük a hasznos gombákat tartalmazó készítményekkel, mert elpusztítanánk azokat már a permetlében. Az előzőleg a bioszerekkel kezelt talajon se ismételjünk a kémiai hatóanyagot tartalmazókkal. Roszik Viktória az *Ökokertek növényvédelme* című könyvében a palántadőlés ellen a zsurlóforrázzal, az erjesztett cickafark levéllel, a kamillateával és a tormaléval való beöntözést javasolja. Próbálják ki és örülnék a visszajelzéseknek!

A felsorolt készítmények többségét, később, a kiültetés után is használhatjuk. A kórokozó gombák az ágyásokban is támadhatnak, a kiültetett palánták is kidőlhetnek. Korai kiültetésnél, gyengébb palántáknál, hűvös és csapadékos időjárásnál megelőzhetjük a fertőzést a gyors beöntözéssel, permetezéssel. Ekkor már a leveleken át felszívódó Trichoderma fajt tartalmazó, Tricho Immun is hatásos lehet.

► Nem csak a levéltetvek, tripszek, kabócák vihetik át a fertőzött növényekről az egészségesekre a vírusokat vagy a fitoplazmákat, hanem a szerszámainkkal pl. a metszőollóval mi is. Az **eszközök fertőtlenítésére** a tehéntej, a hidrogén-peroxid és a háztartási ecet is bekerült az [egyszerű anyagok](#) közé.

► Az idén is kiemelt témánk lesz, a szőlőt pusztító **arany színű sárgaság fitoplazma** elleni védekezés. A saját tőkénk és a borvidékeink érdekében is össze kell fognunk, hogy ne legyen második filoxerajárvány az országunkban. Sajnos a lemetezett vesszőkön is áttelel a kabóca tojása. Talán ezért is született meg az az ajánlás, mely bizonyos előírásokkal, de megengedi a lemetezett venyigék elégetését. Mellékelem a kamara felhívását.

► Hirtelen jött a tavasz. „Már látszanak a kis levelek csúcsai. **Meddig lehet a lemosó permetezést elvégezni?**” -kapom a kérdést szinte naponta. A szilvarügyeket szerdán fényképeztem Hollókőn, egyértelmű, hogy még elvégezhető a lemosás. A már majdnem pirosbimbós kajszit és az őszit ma fotóztam egy pesti kertben. Hiteles szakembert kerestem fel a képekkel. „Még mehet a lemosás mindkét növényenél, rézzel is. Lehet, hogy egy kicsit megcsípi az őszibarack levélcúcsát de a tafrina miatt érdemes elvégezni a rezes lemosást.” - válaszolta. (De ismervén a fajtám rézérzékenységét, természetesen csökkenthetem is a permetlé töménységét!)

Valóban, gondolnunk kell a tafrinára is! A hótól, esőtől átázott talajból felszálló pára is elegendő nedvességet biztosít a fertőzéshez. A rezes nyári hígítású permetlevelei mellett, már felszívódó készítményeket is használhatunk. Ennél az őszinél, a jövő héten már mindenképpen időszerű lesz a védekezés. Erről még írok.



Budapest, 2026. március 13.

Üdvözlettel: Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ üzleteiben](#) az engedélyezett növényvédő szereket, a tápanyagokat, a kerti szerszámozokat is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak a képzett eladóktól!