

2024-ben március 3-án, 2025-ben március 20-án kellett megírnom a virágfertőző moníliaról szóló felhívást. Ekkor kezdtek virágozni a kajszik, majd kisvártatva a meggyek is szirmot bontottak. Az idén sem egyszerűbb a helyzet. Ma beszéltem Csordás Csaba maroslelei kollégámmal. A déli határ mentén már a középérésű kajszik is virágoznak, míg a meggyfák még éppen ébrednek. Úgy tűnik, hogy eltérően válaszolnak a gyümölcsfajok a szélsőségesen változó időjárásra és a fajták között is óriási eltérések vannak. Tovább bonyolítja az előrejelző kollégák helyzetét az, hogy a meteorológiai viszonyok egy falun belül is különbözőek lehetnek ...

A virágzó kajszik miatt most **S.O.S. írok a virágfertőző moniliáról**, de mivel ugyanarról a gombáról beszélünk a meggy esetében is, ezért a visnyére (a meggy régi neve) is kitérek. Sajnos jól [ismerjük a tüneteit](#), a pusztítását. Elviheti az egész termést, később pedig az ágak száradását, de akár fa teljes kipusztulását is okozhatja.

► A tavalyi, vagy a még korábbi fertőzések nyomán, a vesszőkön, múmiákon áttelelő gombatelepekről fűződnek le a fertőző spórák (konídiumok) és ezek indítják a fertőzést. Ha szüretkor nem szedték le a beteg terméseket, nem vágták le a száradó virágokkal teli vesszőket, ágakat, akkor most még pótolhatják ezt. A monília bármelyik virágrészen keresztül behatolhat a vesszőkbe. A vesszők, az ágak belsejében terjedő gombákat, baktériumokat már nem tudjuk elérni, oda nem tudunk bejuttatni gombaölő szert. Tehát **csak megelőzéssel védekezhetünk** a virágfertőző monília ellen. Javasolom, hogy végezzék el a megelőző (preventív) permetezést a virágzó kajszifákon. A pirosbimbósokon is érdemes védekezni, mert már ekkor, a bimbókon keresztül támadhat és fertőzhet ez a kórokozó.

A [meteorológiai előrejelzés](#) nem biztat sok jóval a jövő hétre. A fokozatosan lehülő hőmérséklet lassítani fogja a virágzást, így hosszabban lesznek kitérve a szirmok a fertőzésnek. A megjósolt esők pedig határozottan kedveznek a gombának, a terjedésének. A hétvége viszont még száraz és szélcsendes lesz!

Átnéztem a készítmények tavalyi listáját. Szerencsére van választék, a kajszira, a cseresznyére, a meggyre és az őszibarackra is **engedélyeztek készítményeket a monília ellen**. Ilyen pl. a hidegben is kiválóan védő Chorus 50 WG, a Teldor 500 SC, a Texio, a Switch 62,5 WG (melyet inkább a gyümölcsmoníliaira ajánlják), a Signum WG, a Kenja és a Fontellis 20 SC. Őszibarackban engedélyezett még a Prolectus.

Jó minőségben, apró cseppképzéssel történjen a kezelés. Teljesen be kell fednünk a rügyeket, virágokat! Permetszereink tapadását, esőállóságát a cseppek szétterülését növelhetjük pl. Silwet Star, Nonit, Biosol-Kálszappan, Wetcit, Melius, Heliosol hozzáadásával (3. felhívás). Több biostimuláló készítménynél leírták a monília elleni mellékhatást. A növény ellenálló képességét növelik, és ezzel segítenek minket a küzdelemben.

Hallottam, hogy a biotermesztésű és virágzó meggy ültetvényekben a réztartalmúakkal is próbálkoznak. „Sajnos a fajtákra és egyben a készítményekre is kiterjedő összehasonlító kísérletek nélkül nem tudok biztosan ajánlani olyan rezes gombaölőket melyek nem okoznak kárt.” – a 3. felhívás megállapítása itt is érvényes.

Az *Ökokertek növényvédelme* könyv ajánlása: „virágzás alatt zsurló-vízüveg oldatot használjunk”. Sajnos a dózis nincs megadva. Az egyszerű anyagok közül őszibarackban és cseresznyében a [csalán kivonatát](#) ajánlják a monília virágfertőzés ellen. Próbálják ki! Örölnék a visszajelzéseiknek! Megosztanám a többi kertbaráttal.

Amennyiben mégis megtörtént a fertőzés, azt már a szíromleveleken, a bibén vagy a porzókon is láthatjuk, apró, barna foltok alakjában. A szíromlevelek petyhüdtek. A kajszivirágok tövénél apró mézgacseppek is megjelenhetnek. Később az egész virág elbarnul, nagy részük elszáradva a fán marad. Ez a meggyenél különösen feltűnő. Ekkor már a vessző belsejében terjed a kórokozó. A vesszők száradása gyakran megáll, nem folytatódik a vázágak és a törzs felé, de a szakirodalom a teljes fapusztulást sem zárja ki. **A gyors metszés segíthet!** A fertőzött rész alatt 20-30 cm-rel kell levágni a száradás tüneteit mutató vesszőt, ágat.

► **Nemsokára a meggyfák is virágba borulnak.** A meggy hosszabban virágzik, nehezebb helyzetben van. Ez kedvez a moníliának, mert hosszabb ideig talál fertőzésre alkalmas virágrészt. Majd meglátjuk, hogy mennyi esőt kapunk és hogy az a léghőmérséklet függvényében milyen gyorsan szárad fel, meddig párolog a talajból? Hajnali köd vagy pára után néhány óra alatt megtörténhet a fertőzés! A megpattant meggyrügyeken keresztül is bejuthat a bimbókba a kórokozó. Ezért az ültetvényekben, a folyamatosan nyíló meggyenél megelőzésként már fehér bimbós állapotban védekeznek felszívódó gombaölővel, majd a virágzás hosszától és az időjárástól függően ismételnék pl. teljes virágzáskor, szíromhullásban majd közvetlenül terméskötődés után. Az ültetvények 3-4 kezeléssel számolnak évente. Hűvös, párás időjárásnál a kajszinál is indokolt lehet a két permetezés.

► A cseresznye, az őszibarack, a mandula, egyes szilva fajták és számos dísznövény pl. japánbirs, törpemandula, díszősziarack, díszcseresznye, babarózsa és a Forsythia is károsodhat a virágfertőző moniliától. Ez utóbbit [aranyvessző, aranyfa, aranycserje néven is emlegetik, de semmiképpen sem aranyeső](#).

Budapest, 2026. március 18.

Üdvözlettel: Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a megemlített engedélyezett növényvédő szereket is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak!