



Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken

2026. évi 1. levél

► **A télen néhány éjszaka komolyabb faggal is szembe kellett néznünk és szerencsére csapadékot is kaptunk.** Úgy látom, hogy a vesszőkön telelt pajzstetvek és a kéregpikkelyek alatt bulyó csipkésposloskák sem károsodtak a hidegtől (02.20 -i fotó). A gombák is jól teleltek. (A szőlő lisztharmatánál csak a több éjszakán át tartó mínusz 15 - 20 °C alatti hőmérsékletnél írták le a gombahifák elfagyását.) A rózsabokrokon fennmaradt diplokarponos leveleken és pl. az örökzöld orbáncfű rozsdájának az élénk sárga telepein is életképesek lehetnek a spórák. A fényképek március 4-én készültek.

Egy hét alatt berobbant a tavasz. Kipattantak a jezsámen és néhol már a díszalmák rügyei is! A védettebb ágyásokban már kis leveleket láttam a díszribizskéken. Nemsokára felébrednek a levéltetvek is, mert már találnak táplálkozásra alkalmas zöld leveleket a növényeken. A gyeptetvek sárguló fűszálain még nem találtam meg a rozsdá telepeit, de a melegebb napokon beindulhat ez a gabonákban is nagy gondot okozó gomba. A díszfák is élednek. Fényesek és duzzadtak a vadgesztenyék rügyei. A platánrügyek is zöldek, nemsokára kipattannak. A fiatal leveleken hamarosan megjelennek a csipkésposloskák is.

Az biztos, hogy életképes károsítókkal kezdjük az évet! Hogyan alakul a folytatás? Az elkövetkező hetek, hónapok időjárása alapján kell majd dönteni a védekezésekről.

► **Két permetezést máris javaslok.** Ahol a korábbi években gondot okozott a **rózsa diplokarponos betegsége**, a csillagrozsa, ott érdemes egy rezes permetezéssel megelőzni a fertőzést. Dr. Marácz László *Díszfák, díszcserjék védelme* könyvéből idézek. (Megvásárolható pl. a „kertészeti egyetem” jegyzetboltjában.) „Erős károsítás esetén júliusra a rózsá elvesztheti az összes levelét. A gomba terjedését a hosszan tartó nedves (7 óra) levélfelület, a páras környezet, a 15 °C feletti hőmérséklet elősegíti.” [Az idej tavaszon ezek a feltételek teljesülnek](#). „A gomba általában a lehullott levelekben, de a rügyekben és a hajtások felületén is áttelelhet.” Nehezebb a helyzet az, hogy a mulcsból nem lehet kigereblyézni az összes beteg levelet és a bokrokon fennmaradt lombból is fertőzhet a gomba. Az újabb telepítésnél az ágyás helyének a megválasztásával és a kevésbé fogékony fajták ültetésével is sokat tehetünk a rózsabokrok egészségéért, szépségéért.

Az idei tél tehát nem gyérítette meg jelentős mértékben a kártevő rovarokat és az atkákat sem. **Javaslom, hogy a díszfák, díszbokrokon végezzék el a tavaszi lemosó permetezést!** Nem váltja ki a nyári kezeléseket, de megalapozza a fák egészségét. A korábbi évek fertőzései, kártételei alapján dönthetnek arról, hogy most, tavasszal mit permetezzenek le? A hárs, a juhar, a berkenye, a díszcseresznye, az akác, a bodza, a szivarfa és a rózsá permetezése is szóba jöhet, de talán a platánnál és a tölgynél a legfontosabb a tavaszi lemosás. **A platán csipkésposloska és egyben az apignomónia gomba, a tölgyet a tölgy csipkésposloska és a lisztharmat miatt érdemes megpermetezni.**

A paraffinolaj tartalmú Vektafid A engedélyezett a kéregpedésekben áttelelő levéltetvek, pajzstetvek, csipkésposloskák és atkákat ellen. A réztartalmú növényvédő szerek a gombák, baktériumok ellen engedélyezettek, ilyen pl. a platánok apignomóniás betegsége. Sajnos csak az ún. szükséghelyzeti engedély évente ismételt megkérésével lehet használni ezeket közterületen. A lisztharmat ellen az engedélyezett kén-tartalmú gombaölőket illetve pl. a poliszulfid hatóanyagú Tiosol lombtrágyát is bevethetjük. A lombtrágyáknak is van növényvédelmi mellékhatásuk. A döntést bízzák a növényorvosukra.

