Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák! 138. tájékoztató

Összegyűjtöttem az előző tájékoztató óta történt változásokat, csak a NÉBIH által hivatalosan is kiadott III. kategóriás engedélyeket nézem át.

► Néhány készítmény **engedélyének az érvényességét módosították**. A felsorolásban, a szer neve után zárójelben találják az új dátumot. Ezek az Atonik növekedésszabályozó készítmény (2028.01.31.), a Helicovex rovarölő permetezőszer (2028. 10. 15.), a Medax Top növekedésszabályozó permetezőszer (2029. 05. 15.), a Thiovit Jet gombaölő permetezőszer (2028. 07. 31.) és a Vegesol R gombaölő permetezőszer (2030. 06. 30).

► **Egyéb módosítások**: a Marsh 480 SL gyomirtó permetezőszer (glifozát) élelmezés-egészségügyi várakozási ideje megváltozott a kukorica, repce, napraforgó, búza és árpa esetében. A Rodeo TF gyomirtó permetezőszer gyártója megváltozott. A DiPel DF rovarölő permetezőszer a házikertek fontos készítménye és sok minden megváltozott az engedélyében. Megtalálják itt.

► Újdonság a „**Substral 3 az 1-ben gyomirtó permetezőszer”**, mely az MCPA, a vasszulfát és a mekoprop-P hatóanyagokat tartalmazza. Úgy látom, hogy sláger készítmény lesz. Csak az engedély előírásainak a pontos betartásával tudja majd elérni a házikerti gyepekben a gyomirtó és mohairtó hatást. Idézek az okiratból:

„4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Dózis (g/m2)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
gyep (házi kerti felhasználás)	Magról kelő és évelő gyomnövények, lombosmoha fajok	35,0	kaszálás után, a gyomnövények újra növekedésekor, vagy a lombosmoha fajok intenzív növekedési szakaszában

Előírt növényvédelmi technológia: 8750/86733-1/2026, Nébih
A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Házi kertekben gyepben márciustól augusztus végéig alkalmazható, fagymentes időszakban. A készítményt a fű kaszálását követően, a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények újranövekedésekor, intenzív növekedési szakaszukban, valamint a lombosmoha fajok intenzív növekedésének kezdetén kell 35 g/m² dózisban egyenletesen védőkesztyűben kézzel vagy szórókocsival kiszórni. A szert a kora reggeli órákban a harmat felszáradása előtt kell kijuttatni, amikor a gyomnövények levélfelülete nedves, illetve a talaj nedvességtartalma megfelelő.

A kijuttatás előtti 3 napban nem szabad lekaszálni a gyepet azért, hogy a gyomirtó szer maximális levélfelülettel érintkezzen és a kijuttatás utáni 3 napban sem szabad füvet nyírni, hogy elég idő legyen a felszívódáshoz. Ha a kezelést követő 2 napon belül nem hullott csapadék, akkor meg kell öntözni a területet. A készítmény alkalmazható teljes felületkezelés és foltkezelés formájában.
A kezelést követő első 4 fűnyírás alkalmával keletkezett fűnyesedék nem alkalmas talajtakaró mulcsozásra, valamint komposztálásra. A készítmény használható gyepben lévő fák és fás szárú cserjék alatt is, de a kezelést úgy kell végezni, hogy a szer a növény zöld részeire ne jusson, mert károsodást idézhet elő. Használható ott is, ahol a gyepben hagymás növények nőnek, feltéve, hogy a növény lombozata már természetes módon elhalt.

Újonnan telepített gyepfelületre legkorábban a telepítés után 6 hónappal juttatható ki a készítmény. Nem szabad száraz, aszályos időszakban használni, amikor a gyep stresszhatás alatt áll! A kiszórásnál ügyelni kell arra, hogy a készítmény szomszédos növényekre ne kerüljön, mert azokat károsíthatja. Mivel a vas-szulfát rozsdafoltokat okozhat a köveken, járólapokon, ruházaton stb., ne lépjen a kezelt területre, amíg a készítmény alaposan be nem szívódott. Esetleges kiszóródás esetén még szárazon azonnal fel kell seperni és összeszedni.

A készítmény a következő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: közönséges cickafark (Achillea millefolium), százszorszép (Bellis perennis), komlós lucerna (Medicago lupulina), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), fehér here (Trifolium repens). Mérsékelten érzékeny gyomfajok: kerek repkény (Glechoma hederacea), pongyola pitypang (Taraxacum officinale). A készítmény a lombosmoha fajok ellen jó hatékonyságú.

Hatásmechanizmus: Az MCPA és az MCPP-P hatóanyagok a HRAC 4 (HRAC O) herbicidcsoporton belül a fenoxi-alkán karbonsavak hatóanyagcsoportba tartoznak. A vas-szulfát egy szelektív kontakt mohairtó szer, melynek egyszerű hatásmechanizmusa a perzselő hatásán alapul: a granulátum kijuttatását követően a vas-szulfát reakcióba lép a vízzel és kénsav keletkezik, amely megperzseli és fokozatosan kiszárítja a mohát.”

Budapest, 2026. október 20. Üdvözlettel: Zsigó György, NMNK